

**PHỤ LỤC I**  
**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THUỐC BVTV PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY CHANH LEO**

(Ban hành kèm theo Công văn số: /BVTV-QLT ngày tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục BVTV)

TT	HOẠT CHẤT/ THUỐC BVTV KỸ THUẬT	TÊN THƯƠNG PHẨM	ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
<b>1. Thuốc trừ sâu:</b>					
1	Clinoptilolite	Map Logic 90WP	Tuyến trùng/ chanh leo	Map Pacific PTE Ltd	Liều lượng: 15 kg/ha Thuốc được rải xung quanh gốc cây, rải vào đầu mùa mưa khi thời tiết thuận lợi cho tuyến trùng phát triển mạnh Thời gian cách ly: Không khuyến cáo
2	Emamectin benzoate	Map Winner 5WG	Rệp/chanh leo	Map Pacific PTE Ltd	Liều lượng: 0,02% Phun ướt đều cây trồng khi rệp xuất hiện Thời gian cách ly: 7 ngày
<b>2. Thuốc trừ bệnh:</b>					
1	Chlorothalonil	Daconil 75WP, 500SC	<b>75WP:</b> thán thư/chanh leo <b>500SC:</b> thán thư/chanh leo	Công ty TNHH Việt Thắng	<b>75WP:</b> Liều lượng: 0,04% Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% Thời gian cách ly: 1 ngày <b>500SC:</b> Liều lượng: 0,04% Phun ướt đều cây trồng Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 3-5% Thời gian cách ly: 7 ngày