

PHỤ LỤC III**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY DƯA LƯỚI**

(Ban hành kèm theo Công văn số: /BVTV-QLT ngày tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục BVTV)

TT	HOẠT CHẤT/ THUỐC BVTV KỸ THUẬT	TÊN THƯƠNG PHẨM	ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Thuốc trừ bệnh:					
1	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Bionema 80WP	Tuyến trùng/ dưa lưới	Trung tâm công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh	Liều lượng: 80 kg/ha Thời gian cách ly: Không áp dụng Thuốc được tưới vào gốc cây khi tuyến trùng bắt đầu phát sinh gây hại, lần 2 cách 1 tháng. Lượng nước 2 lít/ gốc
2	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> AT-332	Miyabi WG	Phấn trắng/ dưa lưới	Công ty TNHH Việt Thắng	Liều lượng: 1,5 kg/ha Thời gian cách ly: 7 ngày Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%